

## Skupina 7 – 8 let:

- kos
- sraka
- krt
- deževnik
- navadna kislica
- navadni plešec



# KOS

## Opis:

Velik 24–27 cm, razpon kril od 34–38 cm. Tehta do 125 g. Samec: črn, kljun rumene barve, rumena očesna kolobarja. Samica: rjavkasta, ima rjavkast kljun.

## Življenjski prostor:

Gozd, podeželje, mesta.



Znanstveno ime:  
**Turdus merula**

## Gnezdenje:

od marca do maja  
4–5 jajc, valjenje traja 11–17 dni,  
mladiči zapustijo gnezdo po 12–19 dneh

## Gnezdišče:

na drevju, grmu ali zgradbi; gnezdo ima obliko skodelice iz posušenih bilk, z dodatkom volne, dlake, ostanki polivinilastih vrečk in blata

## Zabavna dejstva:

V Sloveniji naj bi živelo okoli 300.000 osebkov. Kos je v Sloveniji prisoten skozi celo leto. V tople kraje se selijo le mlade ptice, starejše pa ostanejo doma. Črnega kosa pogosto opevajo v ljudskih pesmih. Če kosa kaj razburi, hitro odleti, ob pristanku pa preskaklja krajšo razdaljo in nato dvigne rep. Najljubša hrana so deževniki.



Gnezdo z jajci



Goliči



Samec in samica



Mladiči v gnezdu



Mladič



**Jajca navadnega kosa v gnezdu**



**Mladiči navadnega kosa po  
izvalitvi**



**Mladiči kosa v gnezdu**



**Mladič navadnega kosa**



**Kos: odrasla samica**



Kos: odrasli samec

Fotografija:  
Sfrancisco Montero

# SRAKA



Znanstveno ime:  
Pica pica

## Opis:

Velika 45 cm, od tega 20-30 cm rep. Čez peruti meri 58 cm. Telo je črno-belo obarvano, z belimi območji na prsih, trtici in bazah peruti. Rep in peruti imajo kovinsko zelen ali moder lesk. Samci so večji od samic in imajo daljši rep.

## Življenjski prostor:

Travniki z redkim grmovjem ali drevjem, gozdni rob, jase v strnjenih gozdovih od nižin do gorskega pasu. Poseljuje tudi parke in naselja.




V letu



Gnezdo z jajci in goliči



Mladič



Sračje gnezdo

## Gnezdenje:

od aprila do maja  
6-9 jajc

## Gnezdišče:

drevesna krošnja listavcev in iglavcev, gnezdo iz suhih vej, blata, koreninic

## Zabavna dejstva:

Srača si v obdobju, ko je hrane dovolj, pogosto dela zaloge v jamicah na tleh, ki jih izkoplje naokrog po svojem teritoriju. Srače so zelo pametne ptice, saj znajo uporabljati orodja, imajo dober spomin in znajo dobro predvidevati. Je ena najinteligentnejših živali, ki se lahko kosa celo z nekaterimi človečnjaki. Obstajajo podatki, ki kažejo, da srače lahko živijo do 20 let.

## Odrasla sraka





## Sračja jajca in goliči

© Luis Miguel Ruiz Gordón  
HBW14, p. 552



## Sračje gnezdo z mladičem

Fotografija:

<http://www.hbw.com/ibc/species/60753/gallery>



**Sračji mladič**



## Sraka v letu

Fotografija:  
[https://sl.wikipedia.org/wiki/Sraka#/media/File:Elster\\_wikipedia2.jpg](https://sl.wikipedia.org/wiki/Sraka#/media/File:Elster_wikipedia2.jpg)

# KRT

## Opis:

Ima valjasto telo. Dolg je 12–15 cm, rep je dolg 2–4 cm. Krt tehta do 125 g. Kožuh je žameten, temnosive ali črne barve. Gobček ima rilčasto podaljšan, oči so drobne, uhljev ni.

## Življenjski prostor:

Rahla tla travnikov, polj, listopadnih gozdov.

## Razmnoževanje:

Pari se od marca do aprila. Brejost traja 30 dni. Koti 1-2 krat letno po 3-6 golih, slepih mladičev, ki sesajo 4-5 tednov, po dveh mesecih pa so samostojni.



Znanstveno ime:  
*Talpa europaea*

## Zabavna dejstva:

Rovi so dolgi do 150 m. Rove uredi s spalnimi, gnezdnimi in shrambenimi votlinami, krtine so izrinjen odvečni material.

Ob iskanju hrane krt teka po rovih tudi do 4 ure, nato prav toliko časa tudi počiva.

Krt ima več čutnih organov kot katerikoli sesalec.

Hrani se z deževniki, žuželkami, rovkami. Na dan zaužije za lastno težo hrane.



Krtovo domovanje



Pravkar skoten mladič



Odrasel krt



Mladiči v gnezdu

Krt



Fotografija:  
<https://commons.wikimedia.org>





## Krtine



## Krtovi rovi



Pravkar skoten mladič

gettyimages®

Les Stocker

Fotografija:  
<http://www.gettyimages.com>



Mladiči krta v gnezdu



# NAVADNI DEŽEVNIK

## Opis:


Valjasto telo je sestavljeno iz kolobarjev. Imajo ščetine, s pomočjo katerih se premikajo. V sprednjem delu telesa imajo odebeljen del s sluznimi žlezami, imenovan sedlo. Dihajo s celotno površino telesa.

## Življenjski prostor:

Vrtovi, travniki, polja.

## Razmnoževanje:

Je obojespolnik. Jajčeca odlaga na površje v ovoj iz strjene sluzi. Ob izvalitvi je deževnik velik približno 1 cm.



Znanstveno ime:  
*Lumbricus terrestris*


## Zabavna dejstva:

Ob močnem deževju zaradi pomanjkanja zraka prilezejo na površino, od tod tudi njihovo ime.

V kolikor ima ranjen zadnji del telesa, ga lahko deževnik obnovi.

Na enem kvadratnem metru travnika, lahko najdete tudi do 133 deževnikov.

V enem letu deževnik prebavi 8,12 kg organskih snovi. Njihovi izločki enega leta tehtajo 70 krat več kot deževnik sam.



Parjenje



Kokoni z mladimi deževniki



Deževniki v kompostu



Mladi deževnik



Navadni deževnik

Fotografija: James K. Lindsey



**Glistina -  
iztrebki**

## Parjenje





Deževnikovi  
kokoni



**Mladi deževnik**



**Mladi deževnik**



Deževniki v kompostu


# NAVADNA KISLICA



Znanstveno ime:  
*Rumex acetosa*



Mlada rastlina



Cvetni popki



Cvetoča odrasla  
rastlina



Plod kislice s semeni



Čas cvetenja:

od maja do konca junija

Razvoj plodov:

običajno med julijem in avgustom

Razširjanje semen:

semena raznaša veter

Opis:

Črnkasta korenika. Do 90 cm visoko steblo. Zeleno rumeni ali rdečkasti cvetovi so nameščeni v malocvetnem socvetju. Pritlični listi so jajčasto podolgovati, dolgopecljati. Stebelni listi so suličasti.

Življenjski prostor:

Gojeni travniki, gozdne jase, ob jarkih in po vlažnih gozdovih.

Uporaba:

Liste lahko uporabimo v solati ali kot začimbo za omake in juhe. S sokom kislice lahko s perila odstranimo madeže črnila.

Zabavna dejstva:

Latinsko ime *Rumex* pomeni "sesati" (rumo), saj so Rimljani sesali liste kislice, da so bili manj žejni.



**Kislica: cela rastlina**

Mlada rastlina



unlimited



Listi



**Kislica: cvetni popki**

Fotografija: [Derek Harper](#)

Odrasla rastlina: socvetje in plodovi



Plod kislice s semeni



# NAVADNI PLEŠEC



Znanstveno ime:  
*Capsella bursa – pastoris*



Mlada rastlina



Rastlina v  
naravnem okolju



Seme v plodu



Plod



Socvetje

Čas cvetenja:  
skoraj celo leto  
Razvoj plodov:  
plodove je najbolje nabirati  
med majem in oktobrom  
Razširjanje semen:  
s pomočjo živali (iztrebki)

Opis:  
Majhna rastlina s suličastimi  
listi.

Življenjski prostor:  
Gojeni travniki, gozdne jase, ob  
jarkih in po vlažnih gozdovih.

Uporaba:  
Kot začimba za juhe.

Zabavna dejstva:  
Če semena potresete po vodi  
v kateri se razmnožujejo  
komarji, se bo število  
komarjev zmanjšalo.



**Mlada rastlina**



## Rastlina v naravnem okolju



Socvetje



Plod



Seme v plodu

